

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОДУЛЯРНОГО ДЕРМАТИТА К.Р.С.

Нодулярный дерматит – вирусная болезнь крупного рогатого скота, при которой на коже появляются бугорки. Инфекция передается кровососущими насекомыми. Болезни подвержены породы крупного рогатого скота, зебу, меньше козы, овцы, кролики, морские свинки и мыши. Инфекция входит в группу особо опасных заболеваний, поражая от 5 до 100 стада. Заболевание носит массовый характер. При этом смертность животных составляет 1-2%, реже может быть уничтожено стадо целиком. Молодняк, чистопородные или импортные животные заболевают первыми и переносят заболевание тяжелее других. Основной ущерб наносится не смертностью крупного рогатого скота, а снижением экономической выгоды: шкура становится бракованной, у дойных коров понижается удой, а затем вообще пропадает, самцы становятся стерильными, самки не приходят в охоту.

Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела до 40 и выше. Лихорадка длится 2-3 суток, затем появляются бугорки. Вирус с кровью разносится во все внутренние органы, вызывая их поражения.

Лечение: симптоматическое.

Случаев заражения человека не регистрировалось.

Профилактика и меры борьбы.

Все граждане, имеющие на своих подворьях сельскохозяйственных животных, должны оставаться предельно бдительными и выполнять следующие правила:

- не допускать ввоз животных неизвестного происхождения, без соответствующих документов;
- извещать органы государственного ветеринарного надзора о вновь приобретенных животных, полученном приплоде, об убое и продаже;
- предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию животных для осуществления диагностических исследований и проведению вакцинации;
- извещать ветеринарных специалистов о случаях внезапного падежа или одновременного заболевания нескольких животных.

В случае обнаружения клинических признаков нодулярного дерматита у крупного рогатого скота **немедленно информировать** ГАУ ТО «Тобольский межрайонный центр ветеринарии» по телефонам: 24-66-36; 24-21-53; 24-21-54; 24-21-52.